

Algebra II  
Matematiikan ja tilastotieteen laitos  
Harjoitus 6  
to 4.3.2010

1. Tarkastellaan polynomien  $f = X^4 - 1$  ja  $g = X^3 + X$  virittämää ideaalia polynomirenkaassa  $\mathbb{Z}[X]$ .
  - (a) Etsi jokin  $h \in \mathbb{Z}[X]$ , jolle pätee  $\langle h \rangle = \langle f, g \rangle$ .
  - (b) Osoita, että tekijärenkaassa  $\mathbb{Z}[X]/\langle f, g \rangle$  on alkio  $a$ , jolle pätee  $a^2 = -1$ .
  
2. Olkoon  $R$  rengas ja  $A$  sen ideaali. Todista seuraavat väitteet (lause 6.6):
  - (a)  $A$  on alkuideaali, jos ja vain jos  $R/A$  on kokonaisalue.
  - (b)  $A$  on maksimaalinen, jos ja vain jos  $R/A$  on kunta.
  
3. Oletetaan, että  $A$  on renkaan  $R$  ideaali ja  $B$  on maksimaalinen ideaali tekijärenkaassa  $R/A$ . Olkoon  $\pi$  kanoninen surjektio  $R \rightarrow R/A$ . Osoita, että  $\pi^{-1}B$  on renkaan  $R$  maksimaalinen ideaali, joka sisältää  $A$ :n. (Korollari 6.10.)
  
4. Todista seuraavat väitteet:
  - (i) Jos  $f : M \rightarrow N$  on moduliomorfismi, niin  $\text{Im } f$  on modulin  $N$  alimoduli ja  $\text{Ker } f$  on modulin  $M$  alimoduli.
  - (ii) Jos  $(M_i)$  on perhe modulin  $M$  alimoduleja, niiden summa  $\sum_i M_i$  koostuu alkioista  $\sum_i x_i$ , missä  $x_i \in M_i$  kaikilla  $i$  ja  $x_i = 0$  lukuunottamatta äärellistä joukkoa indeksejä  $i$ .
  
5. Olkoon  $R$  rengas, jolla on ideaali  $A$  ja alirengas  $S$ . Tarkista seuraavat väitteet:
  - (i) Jokainen  $R/A$ -moduli on myös  $R$ -moduli, mutta kaikki  $R$ -modulit eivät ole  $R/A$ -moduleja.
  - (ii) Jokainen  $R$ -moduli on myös  $S$ -moduli, mutta kaikki  $S$ -modulit eivät ole  $R$ -moduleja.

*Vihje:* Ajattele  $\mathbb{Z}_n$ -moduleja.

6. Olkoot  $M$  ja  $N$  jotain  $R$ -moduleja. Osoita, että  $\text{Hom}_R(M, N)$  on  $R$ -moduli, ja että  $\text{Hom}_R(R, M) \cong M$ . (Tässä rengas  $R$  ajatellaan moduliksi omalla kertolaskullaan varustettuna.)